


Avertissements ILE DE FRANCE agricoles



ISSN 0767 - 5542

Grandes cultures

BULLETIN N° 612 DU 11 MARS 1991 - ENVOI N° 3

DEPLIANT POIS ET CEREALES

COLZA : Absence de maladies
Début du vol du charançon de la tige
Bon stade pour les régulateurs de croissance
POIS : Désherbage : les nouveautés

COLZA

■ Stade C2 à D1 (début élongation des tiges, boutons cachés par les jeunes feuilles)

■ MALADIES :

Les colzas ont bien redémarré, ils demeurent chétifs mais sont sains. Seules quelques macules de phoma sont visibles.

Les décolorations blanches sur feuilles sont dues au gel qui a provoqué le soulèvement de la cuticule.

——> pas d'intervention fongicide à prévoir pour le moment .

■ RAVAGEURS :

Deux périodes de 3 jours (du 23 au 25/2 et du 3 au 5/3) ont été favorables au vol du charançon de la tige .

Ce ravageur n'a jamais occasionné de dégâts conséquents en ILE DE FRANCE. Il est, par contre, signalé fréquemment dans l'Aube (torsion ou éclatement des tiges).

——> Remettez en place vos cuvettes jaunes .

Attention : charançon de la tige du colza : bout des pattes noir

charançon de la tige du chou : bout des pattes roux.

——> Seules les parcelles au Sud-est de l'ILE DE FRANCE , à proximité d'anciens colzas infestés, pourront être traitées, dès le retour d'une période ensoleillée.

762




■ REGULATEURS DE CROISSANCE :

Les colzas sont au bon stade pour recevoir un régulateur de croissance.

Spécialité autorisée	TERPAL	PARLAY C+O, 1%AGRAL	BARONET
Stade d'application	C1 C2	C1 C2	C1 D1
Dose/ha	3 1	1,25l	0,5kg
Réduction hauteur floraison	2 à 5%	10 à 25%	15 à 40%
Caractéristiques	foliaire	foliaire et racinaire	racinaire

—> Seules les parcelles denses (plus de 20 pieds par mètre linéaire) portant des variétés sensibles à la verse (Darmor, Eurol) valoriseront le régulateur. En effet, en l'absence de verse, il n'y a pas d'effet positif sur le rendement.

SYNTHESE DES 14 ESSAIS REALISES PAR LE SPV DE 1987 A 1990



POIS

■ NOUVEAUTES EN DESHERBAGE :

En 1990, deux nouvelles spécialités ont reçu une APV pour le désherbage des pois de printemps.

En prélevée : Pépro développe l'association aclonifen et néburon. Le produit préformulé n'est pas disponible sur le marché. Il peut être reconstitué en mélangeant 3,5 l de Challenge 600 avec 1800g de néburon par ha. Dans les essais du SPV, cette association s'est révélée sélective et présente une bonne efficacité sur l'ensemble des dicotylédones, sauf sur renouées des oiseaux où elle est plus irrégulière.

Ne pas mélanger Challenge avec Tribunil, car cette association est très phytotoxique.